

集計表(1)

①平成15年9月から20年12月までに死亡した者の死亡診断名

	男性	女性	男女計
総死亡数	321	208	529
急性心筋梗塞	15	9	24
脳血管疾患	33	39	72
(内訳)			
脳梗塞	21	21	42
脳内出血	11	10	21
くも膜下出血	2	7	9
病型不明	0	1	1
心血管突然死 ^{注1}	50	33	83
悪性新生物	116	67	183
(内訳)			
胃がん	17	9	26
肺がん	36	12	48
大腸がん	11	12	23
その他	52	34	86
他の疾患	107	60	167
死因不明 ^{注2}	1	1	2

注1：死に直結する急性事象の発生から24時間以内の死亡で急性事象の原因が心血管疾患または不明の症例。急性心筋梗塞や脳卒中との重複を含む。

注2：閲覧した小票に該当者なし

②追跡開始(平成10年)から20年12月までに死亡した者の死亡診断名

	男性	女性	男女計
総死亡数	501	320	821
急性心筋梗塞	24	14	38
脳血管疾患	54	54	108
(内訳)			
脳梗塞	31	27	58
脳内出血	20	18	38
くも膜下出血	4	8	12
病型不明	0	1	1
心血管突然死 ^{注1}	72	49	121
悪性新生物	193	110	303
(内訳)			
胃がん	26	15	41
肺がん	56	18	74
大腸がん	19	17	36
その他	89	51	140
他の疾患	158	93	251
死因不明 ^{注2}	2	3	5

注1、注2：上記のとおり

③要因別対象者数および死亡者数(平成10~20年)

分析対象	死因別死亡者数											
	総死亡	A M I	脳卒中	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	心血管S D	死因悪性	肺がん	胃がん	大腸がん	
総計	8648	821	38	108	58	38	12	121	303	74	41	36
喫煙習慣												
非喫煙	6071	387	19	65	33	20	11	60	119	16	22	19
禁煙	953	187	9	18	9	9	0	26	75	21	9	8
喫煙	1624	247	10	25	16	9	1	35	109	37	10	9
飲酒習慣												
非飲酒	6071	387	19	65	33	20	11	60	119	16	22	19
ときどき	953	187	9	18	9	9	0	26	75	21	9	8
ほぼ毎日	1624	247	10	25	16	9	1	35	109	37	10	9
家族歴(父母のいずれかにあり) 心筋梗塞(あり/なし)	8238	785	35	103	56	37	10	114	284	70	36	36
突然死(あり/なし)	410	36	3	5	2	1	2	7	19	4	5	0
脳卒中(あり/なし)	8527	801	34	102	56	35	11	115	296	73	39	35
	121	20	4	6	2	3	1	6	7	1	2	1
BMI(kg/m2)	6783	618	25	78	46	24	9	84	225	52	27	25
20未満	1865	203	13	30	12	14	3	37	78	22	14	11
20~25未満	1594	232	8	28	17	9	2	27	80	25	10	7
25以上	5227	466	21	65	30	26	9	73	176	34	24	23
	1825	121	9	15	11	3	1	20	47	15	7	6
高血圧(あり/なし) ^注	5942	444	18	55	29	19	6	62	182	44	22	22
	2706	377	20	53	29	19	6	59	121	30	19	14
野菜摂取量												
少ない	666	72	3	9	4	4	1	11	21	4	4	5
普通(300g程度)	5261	478	22	59	36	17	6	68	178	41	22	21
多い	2712	271	13	40	18	17	5	42	104	29	15	10
果物摂取量												
少ない	4077	388	17	44	20	18	5	57	137	33	21	15
普通(1単位=80kcal程度)	261	23	3	2	1	1	0	5	10	3	3	1
多い	4295	410	18	62	37	19	7	59	156	38	17	20
卵摂取(ノ週)												
0~3個	4608	412	22	49	31	13	5	60	157	44	17	13
4~6個	2349	215	8	29	13	12	5	34	80	14	13	15
7個以上	1668	192	8	30	14	13	2	27	64	15	10	8
油脂摂取量												
少ない	1451	190	5	24	9	12	3	21	71	21	10	6
普通	5463	534	29	73	43	22	8	91	196	42	26	27
多い	1724	96	4	11	6	4	1	9	36	11	5	3
牛乳(ノ週)												
0本	1319	167	9	28	12	12	4	24	51	10	7	7
1~6本	2868	255	8	26	17	5	4	40	104	25	8	13
7本以上	4247	367	20	46	22	20	4	53	137	37	22	15
みそ汁摂取量(ノ日)												
0~1杯	4874	381	16	53	27	23	3	51	149	33	21	19
2杯	2620	257	12	30	15	10	5	37	98	26	10	13
3杯以上	956	167	8	25	16	5	4	29	51	15	9	2
つけもの摂取量												
少ない	1278	129	10	19	11	6	2	19	36	7	5	5
普通(食塩1g程度)	2804	257	7	34	19	11	3	36	94	19	14	6
多い	4470	429	21	53	27	20	7	66	171	46	22	25

分析対象	死因別死亡者数										
	総死亡	A M I	脳卒中	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	心血管S D	死因悪性	肺がん	胃がん	大腸がん
緑茶摂取量											
週数杯以下	1560	114	6	13	7	4	1	14	27	9	6
二~三日に数杯~一日4杯	3665	292	20	45	22	16	8	53	114	21	18
一日5杯以上	2766	312	9	38	22	13	3	41	123	31	13
ほうじ茶摂取量											
週数杯以下	4126	348	12	53	29	18	7	53	120	27	15
二~三日に数杯~一日4杯	2320	172	12	22	14	7	1	24	74	22	10
一日5杯以上	801	108	9	9	4	3	1	16	37	4	7
ウーロン茶・紅茶摂取量											
二~三日に数杯以下	6144	538	27	72	37	26	9	79	199	46	30
毎日1杯以上	802	41	2	6	4	1	1	8	21	4	3
コーヒー摂取量											
二~三日に数杯以下	5015	535	28	78	42	27	9	81	191	44	29
毎日1杯以上	2689	142	7	16	9	5	2	21	59	13	7
運動習慣											
意識的な運動											
あまり行っていない	5245	462	21	69	39	24	6	70	174	33	25
週2回以下	1143	80	3	11	6	3	2	9	26	6	4
週3回以上	1596	174	10	18	6	8	4	28	69	23	10
一日の歩行時間											
30分未満	1949	171	8	28	19	7	1	28	58	11	7
30分~1時間未満	2762	260	10	37	16	16	5	35	86	20	13
1時間以上	3355	315	17	35	19	12	5	49	133	32	18
睡眠時間											
7時間未満	3058	209	10	28	15	9	3	31	88	19	12
7時間台	3074	214	9	28	12	11	5	29	86	21	13
8時間以上	2107	344	17	50	30	17	4	58	112	26	15
睡眠時間その2											
7時間未満	3058	209	10	28	15	9	3	31	88	19	12
7時間台	3074	214	9	28	12	11	5	29	86	21	13
8時間台	1751	240	9	34	20	11	4	33	87	22	13
9時間以上	356	104	8	16	10	6	0	25	25	4	2
睡眠規則性											
不規則・時に不規則	2654	190	4	20	9	9	2	30	74	14	11
規則的	5461	552	31	84	46	28	10	87	198	50	27
ストレス											
少ない	1127	150	7	35	19	12	5	25	49	13	6
普通	5202	516	26	60	33	19	7	74	203	45	30
多い	1907	99	4	11	5	6	0	18	35	9	4
性格											
腹が立ちやすい?											
あまり立てない	1349	176	6	33	15	12	6	25	56	11	3
普通	5787	519	26	64	36	23	5	75	209	53	34
立ちやすい	1138	74	4	9	6	2	1	15	23	5	3
競争心											
あまり強くない	1732	177	8	32	17	11	4	26	59	11	6
普通	5754	527	27	65	35	23	7	81	204	49	32
強いほう	756	68	1	9	5	3	1	11	26	8	2
緊張しやすい?											
あまりしない	713	129	8	24	14	10	1	23	34	10	3
普通	5263	519	25	64	34	20	10	70	201	44	33
とてもしやすい	2271	123	4	18	9	7	1	25	51	12	4

(注)高血圧ありは収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上または治療中