

令和 7 年度

新潟大学医学部保健学科
第 3 年次編入学

学力検査試験問題

専門科目（看護学専攻）

注 意 事 項

1. この問題冊子は、試験開始の合図があるまで開いてはいけません。
2. 問題冊子は、表紙を入れて 12 枚、解答用紙は 7 枚、他に下書き用紙 1 枚があります。
(落丁、乱丁、印刷不鮮明の箇所などがあった場合は申し出てください。)
3. 解答は、すべて解答用紙の指定された箇所に記入してください。
4. 受験番号は、各解答用紙の指定された箇所に必ず記入してください。
5. 解答時間は、9 時 30 分から 11 時 00 分までの 90 分間です。
6. 問題冊子と下書き用紙は持ち帰ってください。

1 ノンテクニカルスキル (NTS) の定義として最も適切なものを1つ選び記入しなさい。

1. 技術的スキル
2. 社会性のスキル
3. 医療機器の操作に関するスキル
4. 患者の身体的ケアに関するスキル

2 国際機関と事業内容の組合せで適切なものを1つ選び記入しなさい。

1. 国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR) — 有償資金協力
2. 国連教育科学文化機関 (UNESCO) — 児童の健康改善
3. 国連人口基金 (UNFPA) — リプロダクティブ・ヘルスにおける支援
4. 国際労働機関 (ILO) — 平和維持活動
5. 国連世界食糧計画 (WFP) — 二国間の国際保健医療協力

3 ①～⑤の空欄に正しい語句をア～スから選び記入しなさい。

① は、経済協力開発機構 (OECD) の開発援助委員会が作成する援助・受取国・地域リストに掲載された開発途上国、地域に対して経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的として公的機関によって供与される ② 及び条件の緩やかな ③ のことである。つまり、① とは政府機関が開発途上国の発展や福祉の向上に役立てるため、当該国や国際機関を通じて行う ④ を用いた ⑤ による協力のことである。

ア：資金・技術提供	イ：二国間援助	ウ：政府開発援助 (ODA)
エ：NGO	オ：多国間援助	カ：公的資金
キ：贈与	ク：政府	
ケ：貸付	コ：持続可能な開発目標 (SDGs)	サ：民間
シ：国連開発計画 (UNDP)		
ス：NPO		

4 文化看護理論に関する下記の内容で適切なものをすべて選び記入しなさい。

1. レイニンガー(M.M.Leininger)は、看護現象を文化や民俗の視点からとらえ、サンライズモデルとして理論構築した。
2. その文化の内部の人々の見方をエティックな見方、外部者の見方をイーミクな見方という。
3. ジーン・ワトソン(J.Watson)はケアリングの価値観、表現、健康―疾患に関する信念、行動パターンに着目し、文化背景が異なれば看護ケア実践が異なることを明らかにした。
4. 文化ケア的アプローチにおける、ヘルスケアシステムには「民間的ケア」と「専門的ケア」があり、相互に補い合う関係である。

5 ①～⑥の空欄に正しい語句をア～キから選び記載しなさい。

我が国では、患者の安全を守るために行われる医療安全活動を①____とよんできた、しかし①は訴訟や損失などを減らす組織防衛として用いられてきた言葉であるため、近年では、患者の安全を守るために行われる予防活動や医療の質を向上については、②____と表現されている。

医療安全に関する重要な概念として、③____と④____がある。③のうち法的責任があるものが④である。

国や医療施設は、医療安全対策を行うために、事故などの情報を収集・分析する報告システムを作っている。そのための報告書として、⑤____と⑥____がある。⑤はニアミス事例の報告書として用いられ、⑥は実際の事故に至った場合の報告書として用いられることが多い。

ア：インシデントレポート	イ：医療事故	ウ：ヒヤリ・ハット
エ：医療過誤	オ：アクシデントレポート	カ：セーフティマネジメント
キ：リスクマネジメント		

- 6 ムーア, F. D. (Moore, F. D.) が提唱した手術侵襲に対する生体反応で、第 1 相 (傷害期) の生体反応として正しいものはどれか。すべて選び解答欄に番号を記入しなさい。

1. 尿量の増加
2. 血糖値の上昇
3. 心拍数の上昇
4. 脂肪組織の修復
5. 腸蠕動運動の再開

- 7 食道癌について正しいものはどれか。すべて選び解答欄に番号を記入しなさい。

1. 女性に多い。
2. 日本では線癌が多い。
3. 飲酒は危険因子である。
4. 早期には自覚症状はほとんどみられない。
5. 胸部中部食道に好発する。

- 8 A さん (56 歳、男性) は休日に公園を散歩中、階段から落ちて頭部を強打し、意識を消失した状態で病院に救急搬送された。病院到着時の A さんは開眼せず、声は発しているが理解不明である。痛み刺激には逃れようとする動作がみられる。
グラスゴー・コーマ・スケール (GCS) による A さんの意識レベルの評価はどれか。正しいものを 1 つ選び解答欄に番号を記入しなさい。

1. E1V1M2
2. E1V2M4
3. E2V2M2
4. E4V5M5

- 9 心不全と自覚症状、身体所見の組合わせで誤っているものはどれか。1つ選び解答欄に番号を記入しなさい。

1. 左心不全 —— 起坐呼吸
2. 左心不全 —— 頸静脈怒張
3. 右心不全 —— 食思不振
4. 右心不全 —— 肝腫大

- 10 徒手筋力テスト(manual muscle test : MMT)の評価に関する以下の文章を読み、()に入る適切な数値を解答欄に記入しなさい。

抵抗を加えなければ重力に抗して運動が可能な場合、徒手筋力テスト(manual muscle test : MMT)の結果は () / 5 と表記する。

- 11 糖尿病末梢神経障害による感覚障害のある患者へのフットケア指導として正しいものはどれか。すべて選び解答欄に番号を記入しなさい。

1. 両足部を毎日観察する。
2. 熱めの湯をかけて洗う。
3. 靴ずれしない靴を選ぶ。
4. なるべく素足で過ごす。
5. 爪は足趾の先端よりも短く切る。

- 12 老化に伴う血液・造血器系の変化として正しいものはどれか。1つ選び解答欄に番号を記入しなさい。

1. エリスロポエチンが増加する。
2. 黄色骨髄が減少する。
3. 顆粒球数が増加する。
4. 赤血球数が減少する。

13 介護老人福祉施設の説明で誤っているものはどれか。すべて選び解答欄に番号を記入しなさい。

1. 施設を終生利用する者を入所対象とする。
2. 常勤医の配置が義務付けられている。
3. 入所者 100 人当たりの看護師数は 3 人以上である。
4. 新設開設する場合はユニット型個室が原則である。
5. 介護保険で要支援と認定された者も対象に含まれる。

14 Alzheimer (アルツハイマー) 型認知症の患者にみられる遂行機能障害 (実行機能障害) はどれか。正しいものを 1 つ選び解答欄に番号を記入しなさい。

1. シャツを前後反対に着る。
2. 調理の手順がわからなくなる。
3. 物音がすると食事を中断する。
4. 昨日家族の面会があったことを覚えていない。

15 現在の日本の終末期医療において、患者の将来の自己決定能力の低下に備えて、患者・家族と医療者が今後の治療・療養についての気がかりや価値観についてさまざまな局面で繰り返し話し合って共有し、患者の意向に沿った医療を提供することが望ましいとされている。

この内容を示すのはどれか。正しいものを 1 つ選び解答欄に番号を記入しなさい。

1. アドバンス・ケア・プランニング (ACP)
2. アドバンスディレクティブ (AD、事前指示)
3. DNAR (do not attempt resuscitation)
4. リビング・ウィル

16 小児の身体生理機能の発達について正しいものを 1～4 の中から 1 つ選び記入しなさい。

- a. 血小板は生後 6 か月頃に成人と同様になる。
- b. 児生成の IgG は 5～6 歳頃に成人と同程度になる。
- c. 脳波は 11～12 歳で成人と同様になる。
- d. タンパク質分解酵素（プロテアーゼ）の活性は 2～3 歳頃に成人と同様になる。

1. a c 2. b c 3. b d 4. a d

17 川崎病について正しいものを 1～4 の中から 1 つ選び記入しなさい。

- a. 主に 4 歳以下の子どもに発症し、1 歳前後が最も多い。
- b. 川崎病の主要症状には、口唇や口腔の所見としてコプリック斑が見られる。
- c. 急性期の初期治療には、ステロイド大量療法が実施されることが多い。
- d. 冠動脈病変は、冠動脈起始部に発生しやすい。

1. a c 2. b c 3. b d 4. a d

18 小児の骨折について正しいものを 1～4 のなかから 1 つ選び記入しなさい。

- a. 小児の骨膜は薄く繊細なため、骨折部の骨膜は離開し、完全骨折を起こすことが多い。
- b. 骨が成長する部分の骨折(骨端線損傷)では、骨癒合後に成長障がいが起こる可能性がある。
- c. 骨膜の血行が豊富なため、骨膜性仮骨形成能が旺盛で骨癒合しやすく、偽関節や関節拘縮を起こしやすい。
- d. 大腿骨骨折に対して、3 歳頃までは両下肢を垂直に吊る介達けん引が行われることがある。

1. a c 2. b c 3. b d 4. a d

19 小児のバイタルサインに関する以下の文章を読み（ ）に入る適切な数値や語句を記入しなさい。

1. 一般的に乳幼児の心拍数を聴取する場合、心尖部の位置に当たる鎖骨中線上の第（ ① ）肋間に聴診器を当てて行う。
2. 毛細血管再充満時間の正常は（ ② ）秒以内である。
3. 心音は、I 音からIV音までであるが、I 音は（ ③ ）弁と（ ④ ）弁が閉じる音である。
4. 耳式体温計は、（ ⑤ ）温を赤外線で測定をするものである。

20 就労している妊婦に適用される措置、根拠法令との組み合わせで正しいものを選び、記入しなさい。

1. 産前産後の休業-男女雇用機会均等法
2. 妊娠等を理由とする不利な取り扱いの禁止-男女雇用機会均等法
3. 危険有害業務の制限-母子保健法
4. 深夜業の就業禁止-母体保護法

21 妊娠期の不快症状とセルフケアの組み合わせで適切なものを選び、記入しなさい。

1. つわり — においの強い食事の摂取
2. 便秘 — カルシウムの摂取
3. 腰痛 — 硬いマットレスでの就寝
4. こむらがえり（下肢のけいれん） — 水分の摂取を控える

22 A さん（20 歳代後半、初産婦）は、妊娠 12 週である。身長 165cm、体重 63kg（非妊時 60kg）、現在身体活動レベル I（非妊時はレベル II）、妊娠経過は順調である。現時点において非妊時と比べて食事に加えることが望ましいものを選び、記入しなさい。

1. カルシウム
2. 葉酸
3. タンパク質
4. 炭水化物

23 A さん（30 歳、初産婦）の分娩経過は以下の通りである。

午前 0 時 30 分 陣痛周期 10 分

午前 2 時 00 分 入院

午後 4 時 00 分 破水

午後 6 時 30 分 子宮口全開大

午後 7 時 00 分 分娩室へ移動

午後 7 時 50 分 3,200 g、女児を正常分娩、児のアプガースコア 1 分後 9 点

午後 8 時 05 分 胎盤娩出

午後 8 時 30 分 会陰切開部の縫合が終了、分娩時の出血量は 280ml

午後 10 時 05 分 A さんの体温 36.8 度、脈拍 88 回／分、血圧 120/66mmHg

午後 10 時 15 分 分娩室を退出

問 1. A さんの①分娩所要時間、②分娩第 3 期の所要時間を記入しなさい

問 2. 産褥 1 日目、午前 6 時、A さんは「興奮していてあまり眠れませんでした。今ごろ眠くなってきました」と話した。A さんは、脈拍 70 回／分、血圧 110/62mmHg であった。子宮底の位置は臍高、硬度は良好、赤色悪露が中等量みられ、軽い後陣痛を訴えた。A さんへの対応で適切なものを選び、記入しなさい。

1. 休息を促す
2. 導尿をする
3. 下腹部に冷罨法をする。
4. 2 時間後に血圧測定を行う。

問 3. 産褥 1 日目、昼食後、A さんは直接授乳を行っていた。A さんは「母乳だけで育てたいと思っています。いま、何に気をつければよいですか」と話した。

A さんへの説明で最も適切なものを選び、記入しなさい。

1. 「夜は新生児室に預けて休息を取りましょう」
2. 「赤ちゃんが泣いたらまずはおしゃぶりを使いましょう」
3. 「母乳は十分に出ないので赤ちゃんに糖水を与えましょう」
4. 「赤ちゃんがほしがるときはいつでも母乳を飲ませましょう」

- 24 A さん（30 代、女性）は抑うつ状態のために精神科病院に入院し、SSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害薬）の服用を開始した。数日が経った頃、これまでにはみられなかった不安や焦燥感を訴え、対応した看護師へ敵意や攻撃性を向けたり、衝動性の高まりから自傷行為をしたりするようになった。服薬は医師の指示通り継続している。血液検査では異常はなく、発熱や意識障害、振戦もみられない。

A さんに出現している SSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害薬）の副作用として正しいものを 1 つ選び、記入しなさい。

1. 賦活症候群
2. 退薬症候群
3. 悪性症候群
4. 拘禁反応
5. 離脱症状

- 25 A さん（50 代、男性）は統合失調症の患者である。2 週間ほど前から不穏状態となり、心配した訪問看護師とともにかかりつけの精神科病院を受診した。診察では「電磁波が襲ってくる。病院の中にいては危険だ」と訴え声を荒げている。精神保健指定医は A さんが幻覚・妄想状態であると判断し入院の必要性を説明した。しかし、A さんからは同意を得られず、家族等の所在はわかっているものの連絡がつかない状況である。

この時点で要件を満たしている入院形態はどれか。正しいものを 1 つ選び、記入しなさい。

1. 措置入院
2. 医療保護入院
3. 応急入院
4. 任意入院
5. 緊急措置入院

- 26 アルコール依存症について誤っているものを 2 つ選び、記入しなさい。

1. 精神依存と身体依存をきたしている状態である。
2. 覚醒時に飲酒前後の記憶が失われていることをブラックアウトという。
3. 最初の一口で飲酒をやめられなくなり制御がきかなくなることをスリップという。
4. 治療を開始したのちに飲酒をしてしまうことを渴望現象という。
5. 飲酒し続けることを可能にする周囲の人をイネイブラーという。

27 ロールシャッハ検査の説明について正しいものを1つ選び、記入しなさい。

1. クライアントに左右対称なインクの染みのような模様を見せて質問し、反応を解析することで内面を探る。
2. クライアントの知能レベルの測定に用い、言語性知能と動作性知能の結果から行動や認知の特徴の理解に役立てる。
3. クライアントが描いた「実のなる一本の木」の絵から病理を解釈する。
4. クライアントのうつの度合いの測定に用いる。21項目の質問からなる。
5. クライアントの統合失調症の症状査定に用いる。30項目の症状評価項目からなる。

28 国内で初めて治療抵抗性統合失調症に対する適応が承認された抗精神病薬はどれか。
正しいものを1つ選び、記入しなさい。

1. イミプラン
2. アモキサピン
3. クロザピン
4. ミルタザピン
5. カルバマゼピン

29 「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）」に基づく難病についての記述で誤っているものはどれか。1つ選び、記入しなさい。

1. 199疾患が指定難病として指定されている。（2024年4月時点）
2. 治療方法が確立していない。
3. 長期にわたり療養が必要である。
4. 発病の機構が明らかでない。

30 地域包括ケアシステムについての記述である。 内から正しい語句を選び、番号を記入しなさい。

- ・地域包括ケアシステムは、おおむね（ ① ）以内に必要なサービスが提供されることを目指している。
- ・地域包括ケアシステムを進めるうえで大切な自助・互助・共助・公助の4つの“助け”のうち、自らの健康管理（セルフケア）は（ ② ）であり、生活保護は（ ③ ）である。

1. 30 分	2. 60 分	3. 2 時間	4. 自助	5. 互助	6. 共助	7. 公助
---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------

31 訪問看護について、正しいものはどれか。1つ選び、記入しなさい。

1. 訪問看護サービスの提供には、主治医の意見書が必要である。
2. 介護保険適用者には、訪問回数の制限が設けられていない。
3. 特別訪問看護指示書による訪問看護は、介護保険が適用される。
4. 訪問看護ステーションに従事できる職種は、看護師・保健師・准看護師・助産師のみである。

32 発達障害者について、誤っているものはどれか。1つ選び、記入しなさい。

1. 発達障害者の定義は発達障害者支援法に規定されている。
2. 障害者総合支援法における「障害者」には発達障害者が含まれる。
3. 「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。
4. 発達障害者支援センターは市町村が設置する。