

令和8年度

新潟大学医学部保健学科  
第3年次編入学(第2次募集)

学力検査試験問題

専門科目 (看護学専攻)

注意事項

1. この問題冊子は、試験開始の合図があるまで開いてはいけません。
2. 問題冊子は、表紙を入れて11枚、解答用紙は5枚、他に下書き用紙1枚があります。  
(落丁、乱丁、印刷不鮮明の箇所などがあった場合は申し出てください。)
3. 解答は、すべて解答用紙の指定された箇所に記入してください。
4. 受験番号は、各解答用紙の指定された箇所に必ず記入してください。
5. 解答時間は、9時30分から11時00分までの90分間です。
6. 問題冊子と下書き用紙は持ち帰ってください。

1 医療倫理の四原則を記載しなさい。

2 医療安全に関する下記の文章を読み、内から適切なものを1つ選び、その記号を記入しなさい。



ある事実を認識・予見できたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠った場合を（ ① ）という。医療に関わる場所で、医療の全過程において発生する人身事故の発生源に医療機関、医療従事者の（ ① ）がある場合を（ ② ）という。

ア. 有害事象	イ. 医療過誤	ウ. 医療事故	エ. インシデント
オ. アクシデント	カ. ヒヤリ・ハット	キ. 法的責任	ク. 不注意
ケ. 刑事事故	コ. エラー	サ. ニアミス	シ. 過失

3 看護過程に必要なクリティカルシンキングについて、適切でない文章を1つ選び、記号を記入しなさい。

- ア. 看護過程のどの段階においても有効である。
- イ. 物事を否定的にとらえる思考過程である。
- ウ. 問題解決的アプローチを可能にする。
- エ. 看護研究に応用できる。

4 クスマウル呼吸の呼吸パターンはどれか。適切なものを1つ選び、記号を記入しなさい。



5 仰臥位で上腕にて正しく血圧測定した場合より、収縮期血圧が高値となる条件はどれか。  
適切なものを1つ選び、記号を記入しなさい。

- ア. 上腕の血圧測定部位が心臓より高い位置にある。
- イ. 上腕にゆるくマンシエツトを巻く。
- ウ. 巻き上げた袖が上腕を圧迫している。
- エ. 小児の上腕に14 cm幅のマンシエツトを用いる。

6 グリセリン浣腸に関する記述について、適切でないものをすべて選び、記号を記入しなさい。

- ア. レクタルチューブの挿入の長さは5~6cmを目安とする。
- イ. 最初は臍部に向け、その後は脊柱に沿わせるように挿入する。
- ウ. 挿入する際、患者が左側臥位をとれない場合には、仰臥位で実施することがある。
- エ. 浣腸液は、直腸温と同程度に温める必要がある。
- オ. 直腸穿孔が起きた場合に、浣腸液が毛細血管を経て吸収されても問題がないように、グリセリン溶液が用いられる。

7 下記の文章を読み、問1～問3の設問に答えなさい。

65歳の男性。既往に高血圧症があり内服中。20歳から現在まで、1日20本の喫煙を継続している。胃がんに対し腹腔鏡補助下幽門側胃切除術を施行された。術後1日目朝のバイタルサインは、体温38.2℃、血圧168/96mmHg、脈拍98回/分、呼吸回数22回/分、経皮的酸素飽和度94%(室内空気)であり、「動く痛い」との発言があった。術後3日目の体温は37.4℃であり、0時～12時までの尿量は1,500mlであった。術後5日目より流動食が開始された。

問1. 術後経過のアセスメントとして適切なものを2つ選び、番号を記入しなさい。

1. この患者のブリンクマン指数は900であり、術後肺合併症の高リスク群に該当する。
2. 術後12時間の時点でドレーンから1時間に100mL以上の鮮血様の排液を認めた場合、縫合不全が起こっていると判断する。
3. 術後1日目の38.2℃の発熱は、創部感染の初期症状として最も疑わしい。
4. 術後48時間を経過した場合、縫合不全のリスクは脱したと判断する。
5. 幽門側胃切除術において、ドレーンはウィンスロー孔付近に留置されるのが一般的である。
6. 術後3日目の尿量から、手術侵襲による抗利尿ホルモンの分泌不全に起因する多尿が疑われる。

問2. 患者に対する看護介入として適切なものを2つ選び、番号を記入しなさい。

1. 術後1日目、経皮的酸素飽和度の低下があるため、酸素吸入を開始するとともに、酸素消費量を最小限に抑えるためにベッド上での安静を維持する。
2. 術後1日目に腹部の皮膚に握雪感を認めた場合、皮下気腫があると判断し、胸腔ドレナージの準備を行う。
3. 術後1日目の離床時に、Aさんが「傷が痛くてとても動けない」と強く拒否したため、無理な離床は行わず、鎮痛剤の効果が最大となるタイミングに合わせて再度離床を計画する。
4. 体動時に血圧が高い場合には、術後出血を起こすリスクが高まるので、まずは降圧剤を使用して速やかに降圧を図るべきである。
5. 術後3日目、尿量から循環血液量の減少の可能性が高いと判断し、輸液を増やす。
6. 術後5日目、ドレーン排液が白濁した際は、縫合不全を疑う。

問3 . 食事と退院に向けた指導として適切なものを2つ選び、番号を記入しなさい。

1. 食後30分以内に動悸やめまいが起こる際は、低血糖が原因であるため、速やかに飴や砂糖を摂取するよう指導する。
2. 流動食の間は、咀嚼の必要がないため、誤嚥に注意して飲み込むよう指導する。
3. 早期ダンピング症候群が出現した際は、仰臥位又は左側臥位で安静を保つよう指導する。
4. 食後1～2時間は臥床を避け、座って過ごすか、寝る際も上半身を高く保つよう指導する。
5. イレウスを予防するため、ごぼうや玄米など食物繊維の豊富な食材を選ぶよう指導する。

8 下記の文章を読み、問1～問2の設問に答えなさい。

82歳の女性。独居。左中大脳動脈領域の脳梗塞で入院し、急性期の点滴治療を受けている。入院3日目の夜間、突然「泥棒がいる!」「帰らせて!」と大声で叫び、点滴を外してベッドから降りようとした。日中はウトウトしているが、問いかけにはつじつまの合わない返答をする。

問1 . 入院3日目のこの患者の状態に対するアセスメントと看護介入として適切なものを2つ選び、番号を記入しなさい。

1. 脳梗塞後の脳浮腫を最小限に抑えるため、1日の水分摂取量を500mL程度に制限する。
2. 「泥棒がいる」という発言は、記憶障害を背景とした「もの盗られ妄想」の典型的症状であるため、アルツハイマー型認知症の発症と判断する。
3. 存在しないものが見える幻視はレビー小体型認知症の特徴であるため、夜間は間接照明などを用いて室内の陰影をなくし、適度な明るさを保つ。
4. 新たな麻痺の出現や瞳孔不同、刺激に対する反応の変化を確認する。
5. 患者の見当識を維持するため、家族に面会を依頼し、自宅で使い慣れた時計や写真をベッドサイドに置く。
6. 夜間の点滴の事故抜去や尿意による転倒などの事故を予防するため、夜間に予定されている点滴治療は一時中止し、翌朝に再開する。

問 2. この患者の退院に向けた準備と生活指導として適切なものを 2 つ選び、番号を記入しなさい。

1. 転倒時の骨折を予防するため、自宅のフローリングには毛足の長い厚手のラグを全面的に敷き詰めるよう提案する。
2. 入院による体力低下や独居であることを考慮し、退院後の生活支援に向けて入院中に介護保険の申請を多職種と連携して進める。
3. 段差を意識させて下肢の筋力を維持するため、玄関や居間にある 5cm 程度の段差は解消せずに生活するよう勧める。
4. 夜間のトイレ歩行時の転落・転倒を防ぐため、寝室からトイレまでの動線上に人感センサー付きの照明を設置するよう提案する。
5. 再発予防のため、退院後は家事や外出などの活動を制限し、日中も椅子に座って安静に過ごすよう指導する。
6. 誤嚥リスクを低減させて安全に食事を摂取するため、自宅での食事はすべて細かく刻んだ「きざみ食」を準備するよう指導する。

9 小児の髄膜炎をきたす細菌のうち、血清型の置換が問題となっているものはどれか。1 つ選び、その番号を記入しなさい。

1. 髄膜炎菌
2. 連鎖球菌
3. 肺炎球菌
4. リステリア菌
5. インフルエンザ菌 b 型

10 A 君（10 歳、男児）は、身長 135.0cm、体重 40.0kg である。A 君のローレル指数を計算し、その数値を回答欄に記入しなさい。

11 先天性心疾患について述べた以下の文章で正しいものを3つ選び、番号を記入しなさい。

1. 頻度の最も高い先天性心疾患は心房中隔欠損である。
2. 先天性心疾患は生産児（生存して分娩される児）の約10%で発生する。
3. 先天性心疾患の既往を有する成人は年々増加している。
4. 先天性心疾患の手術後は根治しているので、特にケアは必要としない。
5. 肺血流が多くなり肺うっ血をきたす先天性心疾患では、呼吸器感染症になりやすく重症化しやすい。
6. ファロー四徴症の「四徴」とは、「大動脈騎乗」、「心室中隔欠損」、「肺動脈狭窄」、「右室肥大」である。
7. 外科治療が必要な先天性心疾患では、必ず新生児期までに心内修復術を行う。

12 事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと定めている法律はどれか、1つ選び、番号を記入しなさい。

1. 労働基準法
2. 男女雇用機会均等法  
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)
3. 育児・介護休業法  
(育児休業・介護休業等育児または介護を行う労働者の福祉に関する法律)
4. 母体保護法

13 梅毒について正しいものを2つ選び、番号を記入しなさい。

1. ワクチンによる予防が可能である。
2. パートナーの検査は不要である。
3. 細菌感染症である。
4. 第2期でバラ疹を認める。
5. 2010年以降、梅毒罹患者数は減少している。

14 妊娠中のマイナートラブルと保健指導との組合せで適切なのはどれか、正しいものを2つ選び、番号を記入しなさい。

1. 便秘 — 浣腸
2. つわり — 補食
3. 下肢けいれん — 葉酸摂取
4. 浮腫 — 弾性ストッキング
5. 頻尿 — 水分制限

15 子宮復古状態を観察する手順で正しいものを2つ選び、番号を記入しなさい。

1. 褥婦には、観察前に排尿を済ませておくよう伝える。
2. 褥婦には、ファウラー位をとってもらう。
3. 褥婦の膝を伸展させて子宮の位置を確認する。
4. 褥婦の膝を伸展させて子宮底の高さを測定する。
5. 子宮底長は恥骨結合下縁から測定する。

16 新生児が胎児期に母体から受け取った免疫グロブリンは次のどれか、1つ選び、番号を記入しなさい。

1. IgA
2. IgD
3. IgG
4. IgM

17 不妊症について正しいのはどれか、1つ選び、番号を記入しなさい。

1. 不妊症とは、3年以上の期間、生殖年齢の男女が避妊をせずに性生活を行っているにも関わらず妊娠が成立しない場合をいう。
2. 約60%は原因不明である。
3. 女性の年齢は治療効果に影響しない。
4. 検査に基礎体温測定がある。
5. 治療の1つに不妊手術がある。

18 人物と用語の組み合わせとして正しいものを1つ選び、その番号を記入しなさい。

1. ハイネロート — 緊急反応
2. セリエ — ストレス学説
3. キャノン — アレキシサイミア
4. シフネオス — 心身医学

19 「全か無か」思考やマイナス思考といった傾向を知ることで問題対処ができるようになることを支援する心理社会的療法として正しいものを1つ選び、その番号を記入しなさい。

1. 認知行動療法
2. 社会生活技能訓練
3. アサーション
4. マインドフルネスストレス低減法
5. 漸進的筋弛緩法

20 パーソナリティ障害のうち、「著明な感情的な不安定さ」「衝動的な行為」「慢性的な空虚感」「不適切で激しい怒り」「自殺の脅かしや自傷行為の繰り返し」などを特徴とするタイプとして正しいものを1つ選び、その番号を記入しなさい。

1. 境界性パーソナリティ障害
2. 反社会性パーソナリティ障害
3. 回避性パーソナリティ障害
4. 依存性パーソナリティ障害
5. 強迫性パーソナリティ障害

21 Aさん(30代、女性)は5年前に婚約者を交通事故で亡くしている。Aさんの上司は、最近のAさんの様子を見て心配し声をかけた。すると、Aさんは「すみません。婚約者を亡くした時期になると、どうしても気分が落ち込んでしまって」と話した。

Aさんの状態として正しいものを1つ選び、その番号を記入しなさい。

1. 適応障害
2. 急性ストレス性障害
3. 急性一過性精神病障害
4. パニック障害
5. アニバーサリー症候群

22 Aさん(40代、男性、統合失調症)は怠薬したために症状が再燃し、再入院した。入院対応した看護師が怠薬した理由について聴取すると、Aさんは「だって、もう治りましたから。退院してから1錠も飲んでいませんよ。全部捨てました。今だって体調は悪くないですよ。どうして入院なんですか」と訴えた。

Aさんが怠薬した理由として正しいものを1つ選び、その番号を記入しなさい。

1. 特別な理由はない
2. 病識の欠如
3. 精神症状
4. 薬の有害反応

23 Aさん(50代、女性)は橋の上から身を乗り出しているところを通行人によって抑えられている。Aさんは「私はこの世の救世主。私の命を差し出せば、あらゆる人に幸福が訪れるの」と周囲に伝えている。間もなく警察官が到着し保護しようと試みるが、Aさんの様子から警察官は保健所に通報することとした。その後、Aさんは2名の精神保健指定医の診察を受け、その結果、都道府県知事が入院を決定した。

Aさんの入院形態として正しいものを1つ選び、その番号を記入しなさい。

1. 医療保護入院
2. 応急入院
3. 緊急措置入院
4. 鑑定入院
5. 措置入院

24 令和4年度(2022年度)の国民生活基礎調査における介護の状況で、正しいものを1つ選び、その番号を記入しなさい。

1. 要介護者等のいる世帯の世帯構造で一番多いのは単独世帯である。
2. 要介護者等からみた「同居の主な介護者」は、男女の割合が約3:7で女性が多い。
3. 要介護者等の年齢は、80歳以上が約5割である。
4. 要介護者等からみた「同居の主な介護者」の続柄は、「子」が最も多い。

25 介護保険制度に関する記述である。□□□□内から適切なものを1つ選び、その記号を記入しなさい。

- ・要介護認定は、介護の必要量を全国一律の基準に基づき客観的に判定する仕組みであり、( ① )が申請者について要介護認定を行う。
- ・介護保険の財源構成は、保険料：公費が( ② )である。
- ・2070年には総人口が9000万人を割り込み、高齢化率は約40%にまで上昇する見込みである。2040年には、( ③ )高齢人口が増加しサービスの需要が急増する見込みである。また、ほぼすべての地域で生産年齢人口は減少する。

ア. 都道府県    イ. 市町村    ウ. 地域包括支援センター    エ. 2:8    オ. 5:5  
カ. 7:3    キ. 都市部で    ク. 過疎地域で    ケ. 都市部・過疎地域とも

26 要介護1の高齢者に対する在宅療養支援において、支援に関与する者とその役割の組み合わせで正しいものを1つ選び、その番号を記入しなさい。

1. 市町村保健師    - 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
2. 薬剤師    - 内服薬の処方
3. 訪問介護    - 服薬の確認
4. 介護支援専門員    - 家事援助

27 地域包括支援センターについて、誤っているものを1つ選び、その番号を記入しなさい。

1. 設置主体は都道府県である。
2. 地域ケア会議を実施する。
3. 介護予防ケアマネジメントを行う。
4. 総合相談支援事業を行う。